BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Edition Grandes Cultures

REGION CENTRE

BULLETIN TECHNIQUE N° 31

26 Octobre 1995

COLZA CEREALES Pucerons: Maintenez la surveillance

Cicadelles : Activité importante dans les secteurs à risque.

Pucerons: Arrivées des pucerons conjointes avec les premières levées. Intervenez en présence de cicadelles ou dès que le seuil de 10 % de pieds porteurs de pucerons est atteint (dès le stade levée à 1 feuille le plus souvent).

Un renouvellement de la protection est fréquemment nécessaire.

COLZA

STADE: Formation de la rosette.

RAVAGEURS:

Dans l'ensemble, un traitement a été réalisé visant l'ensemble des ravageurs (charançon du bourgeon terminal, altises et pucerons).

Cependant, les pucerons restent d'actualité, en particulier en Indre et Loire où des pucerons cendrés sont signalés à Ligueil (importantes colonies), Rilly/Vienne et Reignac. Intervenez rapidement en situations non traitées ou si le seuil de 20 % de pieds porteurs de pucerons est dépassé.

CEREALES

STADE : Levée à "3 feuilles".

CICADELLES PSAMMOTETTIX:

L'activité de l'espèce Psammotettix reste importante en particulier sur les levées du Cher et de l'Indre (voir tableaux des captures ci-après).

Rappel de la stratégie : Dans les secteurs à risque, en présence de cicadelles, une intervention doit être réalisée au stade "1 feuille" puis renouvelée si besoin à "2-3 feuilles".

Un renouvellement du traitement est souvent nécessaire dans le Cher et l'Indre, il visera également les pucerons, très présents sur les premières levées.

Récapitulation des secteurs à risque (observations de l'automne et cas observés les années précédentes)

> Cher, Indre.

> Eure et Loir - secteurs boisés : Maintenon, Bouglainval, Houx, Gas, Chaudon, Nogent le Roi, Bronville, Arrou, Montigny le Gannelon, Nord de Dreux (Courtemanche, Illiers L'Evêque en limite de l'Eure), bordure Yvelines/Eure (Villiers en Desoeuvre).

> Loiret : Briare, La Selle/Le Bied, Vienne en Val, Le Bardon.

> Indre et Loire : Plateau de Champeigne, secteur de Reignac/Indre.

> Loir et Cher : Chambon/Cisse, Herbault, Onzain.

SPV-SDA	10 au	16 au
<i>LOIRET</i>	16/10	23/10
Bonny/Loire (jachère) Bonny/Loire (orge hiver)	1 2	7

SPV-AGRICHER	10 au 16/10	16 au 23/10
CHER:		
Vornay (jachère)	27	
Vornay (semis blé)	77	96
Nérondes (repousses)	3	3
Oizon (traité le 12/10)	13	7
St Michel (jachère)	1	8
Jalognes (jachère)	13	35
Jalognes (semis blé)	14	5
Chaumoux-Marcilly (jachère)	0	2
Chaumoux-Marcilly (blé)	5	5
Blancafort (traité le 13/10)	31	9
Dampierre en Crot (blé 1-2 F)	230	
La Chapelote (semis)	14	1
Sury es Bois	0	
La Marche (blé)		5
INDRE:		
Chouday (repousses blé)	1	1
Levroux (semis blé)		18

SPV-IMMEDIA INDRE	10 au	16 au	
	16/10	23/10	
Mâron (jachère)	0	4	
Martizay (jachère)	4		
Segry (escourgeon)	15	4	
Neuvy Pailloux (repousses)	43	3	
Issoudun (jachère)	7	7	
Thizay	4	4	
Chézelles (orge 2F)	49		
Levroux	6	17	
Arpheuilles	1 1	16	
Mosnay		5	
Luçay le Mâle (jachère)		10	
Luçay le Mâle (semis)		35	
Le Blanc		5	
Faverolles (repousse cér.)	2	13	
Faverolles (jachère)	0	1	

SPV-MARTIN BARON EURE ET LOIR	10 au 16/10	16 au 23/10	
Gas (escourgeon 1 F)	9	34	
Maintenon (escourgeon 1-2 F)	19	20	

870

direction régionale de l'agriculture et de la forêt

SPV-CHAMBRE AGRIC. EURE ET LOIR	10 au 16/10	16 au
Prudemanche	16/10	23/10
		6
Vichères (semis)		8
Arrou (semis)		1
Gas (semis)		6
Theuvy (semis)		6
Néron (semis)		18

SPV-CHAMBRE AGRIC. INDRE ET LOIRE	10 au 16/10	16 au 23/10
Sublaines (jachère fétuque) Sublaines (jachère trèfle)		14 14

SPV-BAYER	10 au	16 au
EURE ET LOIR	16/10	23/10
Brouè (orge 3 F)		6

PUCERONS / JNO:

Le vol continue à s'accentuer (voir courbe). Le pouvoir virulifère évalué à l'aide des pots pièges montre 81 % de pots positifs pour 100 % de pots colonisés par les pucerons. Les tests ELISA effectués sur les pucerons ailés capturés à la tour indiquent 40 % de pucerons virulifères, situation stationnaire par rapport à la semaine précédente.

Des arrivées massives d'ailés sont observées sur les parcelles levées ou en cours de levée. Le seuil de 10 % de pieds porteurs est le plus souvent dépassé, quelque soit le stade de la céréale (Loiret: 25 % à Vennecy, stade 1 feuille - 40 % à Germigny, stade 1 à 2 feuilles - Indre et Loire: 20 % à Ligueil, 5 à 10 % à Chateaurenault, 15 à 20 % à Reignac, 5 à 10 % à Monnaie - Cher: 60 % à Vornay, stade 2 feuilles).

Dans les parcelles traitées, les réinfestations se produisent rapidement. Aussitôt qu'une nouvelle feuille apparaît, la recolonisation peut débuter ; aussi, avec la douceur des températures actuelles, ce phénomène est accentué cet automne.

Intervenez sur les parcelles n'ayant pas encore reçu de protection insecticide, dès que le seuil de 10% de pieds porteurs de pucerons est atteint.

Sur les parcelles traitées la semaine passée, surveillez les réinfestations et renouvelez l'application si le seuil de 10 % de pieds porteurs est à nouveau atteint (ce qui est souvent le cas). Pas d'intervention sur les parcelles protégées GAUCHO.

RESULTATS JNO 1995

Dates	% de pots porteurs de Rhopalosiphum padi		Nombre de <i>Rhopalosiphum</i> padi moyen/plante touchée		% de pots	
	1995	1994	1995	1994	1995	1994
05/09 au 12/09	11 %	92,5 %	3	2,8	7.5 %	71 %
12/09 au 19/09	64 %	35,2 %	2	2,95	40 %	34 %
19/09 au 26/09	98 %	77,8 %	2,7	2,6	66 %	43 %
26/09 au 03/10	100 %	96,3 %	4	2,4	77 %	63 %
03/10 au 10/10	89 %	100 %	2,1	4	45 %	61 %
10/10 au 17/10	100 %	72,7 %	12	2,7	81 %	84 %
17/10 au 24/10	100 %	98 %	3,6	3,6	à venir	95 %

